



BAYER
ADVANCED

Bayer CropScience Inc.
Suite 200, 160 Quarry Park Blvd. SE,
Calgary, Alberta T2C 3G3
Téléphone : 1-888-283-6847
www.bayeres.ca



ATTENTION

POISON

IRRITANT OCULAIRE

GARANTIE : Imidaclopride 0,25%
N° D'HOMOLOGATION : 29738
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET :

2 KG

Insecticide

Merit[®]

GRUPE

4

INSECTICIDE

GRANULÉ

Pour la suppression des espèces de
vers blancs spécifiées dans
les pelouses résidentielles.

USAGE DOMESTIQUE

MERIT[®] est une marque déposée de Bayer.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



CA80975732A
130325 04/13

AVIS À L'UTILISATEUR



Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

LE PRODUIT

L'INSECTICIDE MERIT peut être utilisé pour la suppression des larves souterraines du hanneton européen, du scarabée japonais et du scarabée noir du gazon et pour la répression des larves de la tipule des prairies. L'INSECTICIDE MERIT peut être utilisé selon le mode d'emploi sur les pelouses résidentielles, y compris le gazon autour des arbustes et des arbres.

AIDE-MÉMOIRE

Granules faciles à utiliser pour la suppression des insectes spécifiés avant qu'ils n'endommagent la pelouse.

INSECTES	Pour la suppression de certaines espèces de vers blancs (larves du hanneton européen, du scarabée japonais et du scarabée noir du gazon). Réprime également les larves de la tipule des prairies.
COUVERTURE	Le contenant de 2 Kg couvre 179 m ² (1 925 pi ²).
LIEUX D'APPLICATION	Le gazon, y compris la pelouse autour des arbustes et des arbres.
PÉRIODE D'APPLICATION	De mai à la mi-août (de la fin de l'été au milieu de l'automne pour les larves de la tipule des prairies). Voir le mode d'emploi.
QUANTITÉ À UTILISER	Voir la section « Réglages des épandeurs ».
 	Questions ou commentaires : Composez sans frais le 1-888-283-6847 ou visitez le site www.bayeres.ca .

PRÉCAUTIONS

La poussière peut causer la toux, l'éternuement ou le larmolement et aggraver les troubles respiratoires. Il est recommandé de porter un masque durant les opérations de mélange, de chargement et d'application du produit.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Nocif en cas d'ingestion ou d'absorption cutanée. Cause une irritation des yeux. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Bien laver avec de l'eau et du savon après avoir manipulé.

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion	<ul style="list-style-type: none">• Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.• Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin.• Ne faire boire aucun liquide à la personne empoisonnée.• Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
En cas de contact avec la peau ou les vêtements	<ul style="list-style-type: none">• Enlever tous les vêtements contaminés.• Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes.• Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
En cas de contact avec les yeux	<ul style="list-style-type: none">• Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes.• Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil.• Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
En cas d'inhalation	<ul style="list-style-type: none">• Déplacer la personne vers une source d'air frais.• Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible.• Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.	

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Il n'existe pas d'antidote. Traiter le patient selon les symptômes.

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Ce produit est très toxique pour les invertébrés aquatiques. Ne pas appliquer directement sur l'eau. Ne pas contaminer les systèmes aquatiques par suite de l'élimination des déchets ou du nettoyage de l'équipement.

TOXIQUE pour les oiseaux.

TOXIQUE pour les abeilles. Les abeilles peuvent être exposées aux résidus de produit dans les fleurs, sur les feuilles, le pollen et/ou le nectar par suite d'une application de granulé.

ENTREPOSAGE

Entreposer le produit dans le contenant d'origine, hors de la portée des enfants, de préférence dans une armoire verrouillée.

ÉLIMINATION

Ne pas réutiliser ce contenant. Le déposer aux ordures ou mettre au recyclage, s'il y a lieu.

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial.

Ne pas contaminer l'eau ni la nourriture de consommation humaine ou animale par suite de l'entreposage ou de l'élimination du produit.

MODE D'EMPLOI

Lire intégralement le MODE D'EMPLOI avant d'utiliser l'INSECTICIDE MERIT.

AVANT D'UTILISER	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas appliquer ce produit à proximité de piscines, d'étangs, de ruisseaux ou de lacs. • Ne pas utiliser dans les jardins potagers. <p>Ce produit chimique possède les propriétés et les caractéristiques associées aux produits chimiques décelés dans l'eau souterraine. L'utilisation de MERIT dans les endroits où les sols sont perméables, et particulièrement là où la nappe phréatique est peu profonde, peut être responsable d'une contamination de l'eau souterraine.</p>
POUR LA SUPPRESSION DES LARVES DU HANNETON EUROPÉEN, DU SCARABÉE JAPONAIS ET DU SCARABÉE NOIR DU GAZON	<p>Les larves peuvent causer d'importants dommages aux pelouses en se nourrissant des racines du gazon. Le gazon jaunit, puis brunit et meurt. Comme les larves mangent les racines, le gazon est facile à arracher avec les mains. Vous pouvez l'enrouler comme un tapis et découvrir les larves en dessous. Si des plaques de gazon mort sont apparues sur votre pelouse à la fin de l'été dernier, vérifiez la présence de larves.</p> <p><u>Période d'application :</u> Faire une application à tout moment entre mai et la mi-août. Appliquer avant l'éclosion des œufs de l'insecte ciblé. La meilleure période pour appliquer l'INSECTICIDE MERIT INSECTICIDE est lorsque les adultes volent en grands nombres, au début de la ponte ou durant la ponte. Communiquez avec votre conseiller horticole pour connaître la meilleure période d'application de ce produit dans votre région.</p>
POUR LA RÉPRESSION DES LARVES DE LA TIPULE DES PRAIRIES	<p>La tipule des prairies cause souvent des dommages en mangeant les racines et en déplaçant la surface du sol.</p> <p><u>Période d'application :</u> Appliquer lorsque les tipules adultes volent <u>en août et en septembre et commencent à pondre</u>. Si l'INSECTICIDE MERIT a été appliqué sur le gazon plus tôt durant l'été pour supprimer les larves du hanneton européen, du scarabée japonais et du scarabée noir du gazon, NE PAS FAIRE DE NOUVELLE APPLICATION pour réprimer la tipule des prairies au cours de la même année.</p>
LIEU D'APPLICATION	Le gazon, y compris la pelouse autour des arbustes et des arbres.

MODE D'APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer l'INSECTICIDE MERIT UNE FOIS PAR ANNÉE SEULEMENT, conformément au mode d'emploi sur cette étiquette. • La nécessité du traitement peut être basée sur les antécédents du site, les observations antérieures, les résultats de piégeage des adultes de la saison en cours, ou d'autres données. • Régler l'épandeur de façon à distribuer 11,2 g de produit par m² (voir la section « Réglages des épandeurs »). • Pour s'assurer de couvrir uniformément toute la surface, traiter d'abord le périmètre de la pelouse puis se déplacer vers le centre. Faire des passages parallèles, en se déplaçant à un rythme constant afin d'assurer une distribution égale des granules. • Les granules doivent être arrosés tout de suite après l'application (moins d'une heure) avec suffisamment d'eau (5 à 10 mm) pour s'assurer que la substance active se déplace à travers le chaume. Éviter l'arrosage excessif (plus de 20 mm). Après l'application du produit, éviter le ruissellement ou la formation de mares par suite de l'arrosage. • Éviter d'appliquer l'INSECTICIDE MERIT sur les surfaces de gazon saturées d'eau, car la substance active ne pourra pas pénétrer dans la zone de la plante, ce qui réduira l'efficacité du produit. • S'assurer de ne pas laisser de granules sur les surfaces dures (l'allée de stationnement, par exemple).
POUR DES RÉSULTATS OPTIMUMS	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer tôt avant l'éclosion des œufs. • Après l'arrosage, attendre que la substance active des granules se soit infiltrée dans le sol avant de tondre le gazon.
MODE D'ACTION	<p>Une fois que l'INSECTICIDE MERIT s'est infiltré, une zone protectrice se forme dans le sol. Si le produit est appliqué avant l'éclosion des larves, il supprime certaines espèces de vers blancs (larves du hanneton européen, du scarabée japonais et du scarabée noir du gazon). Il peut également réprimer les larves de la tipule des prairies.</p>

RÉGLAGES DES ÉPANDEURS

Si votre épandeur ne figure pas dans la liste, appelez notre ligne-info du Service à la clientèle, 1-888-283-6847, pour obtenir de l'aide.

Dose : 1,12 kg par 100 m²

ÉPANDEURS À LA VOLÉE	1,12 kg par 100 m ²	Distance entre les passages (m)
Modèle (ART: Broadcast spreader)	RÉGLAGE	
SCOTTS BASIC	5	1,8
SCOTTS STANDARD	4¾	1,8
SCOTTS DELUXE EDGE GUARD	5¼	1,8
VIGORO 10000	6½	2,4
VIGORO 50000	4½	2,4
ÉPANDEURS PAR GRAVITÉ	1,12 kg par 100 m ²	Distance entre les passages (m)
Modèle (ART: Drop spreader)	RÉGLAGE	
SCOTTS ACCUGREEN 1000	8½	S.O.
SCOTTS ACCUGREEN 2000	8¼	S.O.
SCOTTS ACCUGREEN 3000	6¼	S.O.

Les réglages sont approximatifs. L'état de votre épandeur, la vitesse de déplacement et un terrain accidenté peuvent influencer sur la dose d'application. Calibrez votre épandeur en suivant les directives du fabricant.

Truc : 100 m² = 10 m sur 10 m

N'utilisez pas un épandeur qui distribue les granules en bandes étroites, concentrées ou inégales. Assurez-vous que l'épandeur fonctionne normalement et répartit uniformément les granules.

RETOUR SUR LA SURFACE TRAITÉE



Les enfants et les animaux de compagnie peuvent retourner sur la surface traitée après que celle-ci a été arrosée et a séché.

GARANTIE

Garantie de remboursement : Si vous n'êtes pas satisfait de ce produit, nous serons heureux de vous rembourser le prix d'achat d'origine.

130325

Bayer



GROUPE 4 INSECTICIDE

INSECTICIDE MERIT®

GRANULÉ

Pour la suppression des espèces de vers
blancs spécifiées dans les pelouses résidentielles.

USAGE DOMESTIQUE

GARANTIE : Imidaclopride 0,25%

N° D'HOMOLOGATION : 29738 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



IRRITANT OCULAIRE

PRÉCAUTIONS: La poussière peut causer la toux, l'éternuement ou le larmolement et aggraver les troubles respiratoires. Il est recommandé de porter un masque durant les opérations de mélange, de chargement et d'application du produit. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif en cas d'ingestion ou d'absorption cutanée. Cause une irritation des yeux. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Bien laver avec de l'eau et du savon après avoir manipulé. **PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion :** Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne faire boire **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour

obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec les yeux :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'inhalation :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale. **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Il n'existe pas d'antidote. Traiter le patient selon les symptômes. **RISQUES ENVIRONNEMENTAUX :** Ce produit est très toxique pour les invertébrés aquatiques. Ne pas appliquer directement sur l'eau. Ne pas contaminer les systèmes aquatiques par suite de l'élimination des déchets ou du nettoyage de l'équipement. TOXIQUE pour les oiseaux. TOXIQUE pour les abeilles. Les abeilles peuvent être exposées aux résidus de produit dans les fleurs, sur les feuilles, le pollen et/ou le nectar par suite d'une application de granulé. **ENTREPOSAGE :** Entreposer le produit dans le contenant d'origine, hors de la portée des enfants, de préférence dans une armoire verrouillée. **ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser ce contenant. Le déposer aux ordures ou mettre au recyclage, s'il y a lieu. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. Ne pas contaminer l'eau ni la nourriture de consommation humaine ou animale par suite de l'entreposage ou de l'élimination du produit. **AVIS À L'UTILISATEUR :** Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

Bayer CropScience Inc.

Suite 200, 160 Quarry Park Blvd. SE, Calgary, Alberta T2C 3G3

Telephone: 1-888-283-6847

www.bayeres.ca

MERIT® est une marque déposée de Bayer.

CONTENU NET : 2 Kg

CA80975732A 130325 04/13

